

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Es un producto que puede ser tóxico, por lo que deberá evitar su inhalación, ingestión y contacto con la piel, puede causar irritación ocular.

ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA.

NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NO SE REUTILICE ESTE ENVASE.

EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Siege® no requiere de medidas especiales si se almacena y maneja correctamente. Almacénese el producto en lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, ventilado, protegido de luz solar, alejado del calor y humedad, lejos de alimento para animales, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manténgase el producto en su envase original. Al manipular este producto sugerimos el uso de guantes de plástico y lavarse las manos con agua y jabón después de manipularlo.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES.

Siege® contiene hidrametilona, ingrediente activo que pertenece al grupo de las amidinohidrazonas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos, si se presenta irritación proporcionar atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

En caso de ingestión: Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar dos vasos de agua e induzca el vómito. Proporcionar atención médica inmediatamente.

ALEJE A LA PERSONA DEL AREA

EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

**EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.**

**LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) DE AMIFAC AL
TEL. 01 (55) 5595-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.**

GARANTÍA

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.



INSECTICIDA / GEL USO DOMÉSTICO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Hidrametilona

(Equivalente a 20.8 gr de i.a./kg)..... NO MENOS DE:2.00%

%EN PESO

INGREDIENTES INERTES:

Formador de sal, preservativo,

agente gelante, solvente,

atrayernte, antiespumante,

cosolvente NO MÁS DE: 98.00%

TOTAL 100.00%

REG. RSCO-DOM-INAC-181-309-092-02

CONTENIDO NETO: 24 jeringas de 30 g

INSTRUCCIONES DE USO

Use el gel **Siege®** sólo en áreas que no sean fácilmente accesibles para niños y mascotas. El gel **Siege®** puede ser usado en gotas o como tratamiento en grietas y hendiduras para el control de cucarachas dentro y alrededor de casas, industrias procesadoras de alimentos y, en áreas en donde no haya comida o alimentos, en bodegas institucionales y establecimientos comerciales incluyendo hospitales, laboratorios, cuartos de computadoras, drenajes, autobuses, barcos, trenes, tiendas de mascotas y zoológicos.

No aplique **Siege®** en áreas y / o maquinaria que esté en contacto directo con alimentos. Se puede usar en cuartos de basura, lavabos, drenajes, entradas, vestíbulos de oficinas, closets, cuarto de máquinas, cocheras y cuartos de almacenaje en general.

La dosis de aplicación depende del nivel de infestación y de las especies a controlar:

| Especie de cucaracha | Dosis de aplicación (gr/m ²) Área de superficie infestada. | Método de aplicación |
|--|---|-------------------------------|
| Pequeñas: <i>Germánica Blatella germanica</i> <i>Bandas cafés Supella supellectilium</i> | 0.25-0.50 | Capa delgada o gotas pequeñas |
| Grandes: <i>Americana Periplaneta americana</i> <i>Oriental Blatta orientalis</i> <i>Café Periplaneta fuliginosa</i> | 0.5-1.0 | Manchas grandes |

La aplicación de la dosis baja debe ser usada para infestaciones bajas o moderadas y la dosis alta para infestaciones más severas. Los sitios de aplicación deben ser, en o cerca de cubiertas ó áreas de agregaciones como grietas o hendiduras, esquinas ó áreas de movimiento. Utilice sitios incluyendo superficies debajo de mesas, mostradores, repisas, cajones y lavaderos; y alrededor de conexiones de tuberías y encima de plafones, dentro de cajas eléctricas, junto o sobre botes de basura, abajo y detrás de estufas y refrigeradores, alrededor coladeras, equipo eléctrico y máquinas.

Las áreas prioritarias a tratar pueden ser identificadas por inspección visual o con ayuda de técnicas de trapeo.

Para aplicar el gel remueva la tapa del aplicador, ponga la punta sobre la superficie y aplique, vuelva a tapar el aplicador después de que se complete el tratamiento. El cebo se adherirá a superficies sin grasa y sin polvo, el cebo permanecerá palatable a las cucarachas mientras este visible.

Se proveerá un control más rápido si el gel se coloca en poca cantidad en numerosos lugares, que si se hace en grandes cantidades en pocos lugares, especialmente para el control de cucaracha germánica.

La reducción de la población se verá después de una semana o menos, las cucarachas entrarán en estado letárgico, después de ingerir el gel y algunas podrán ser vistas durante horas del día.

Reaplique cuando el cebo ya no sea visible de acuerdo al nivel de infestación, el cual será generalmente a una dosis más baja que la del tratamiento inicial. Se recomienda una inspección visual de los lugares en donde se colocó el cebo una semana después del tratamiento inicial donde se trate de controlar altas infestaciones. Se deba hacer una segunda aplicación si el cebo ya no es visible.

Nota: No aplique el gel en áreas las cuales han sido recientemente tratadas con insecticidas, ya que esto causará que el cebo sea repelente. No coloque el cebo en lugares que son usualmente lavados ya que el cebo será removido por el lavado. No aplique tratamientos en lugares donde las operaciones de limpieza provoquen que se mezcle con alimentos.

HECHO EN: E.U.A.

ENVASADO EN MÉXICO

® Marca registrada de BASF

Fecha de elaboración:

Lote:

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975,

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, MÉXICO 03710 D.F.

TEL: 01 (55) 5325-2600

Fecha de caducidad:

2 años después de su elaboración.

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PRECAUCIÓN